



Stanoviště 6

Důl Otov Fučná

PRACOVNÍ LIST II. 6. 6.

Jméno žáka:

Druhy netopýrů spatřeny v Ohnišťovických štolách.

Zkus je poznat podle popisu a přiřaď správné fotografie.¹⁻³

- 1) Zbarvení létacích blan má světle hnědé, srst na břiše šedobílou. Loví a létá při vodní hladině. Zimu přečkává v jeskyních, sklepech, přes léto je ve skalních štěrbinách nebo škvírách stromů. Patří mezi silně ohrožené druhy. Latinsky se jmenuje *Myotis daubentonii*
- 2) Letní kolonie se vyskytují ve skulinách a štěrbinách lidských staveb i v dutinách stromů. V zimním období ho lze zastihnout v podzemních prostorách, většina populace však využívá jiné úkryty. Potravou mu je dvoukřídlý hmyz na okrajích lesů. Ten buď chytá v letu, nebo jej sbírá z vegetace svým typickým ocasem (ocasní blánou). Srst na břiše má šedobílou. Patří mezi silně ohrožený druh. Latinsky se jmenuje *Myotis nattereri*.
- 3) Letní kolonie samic s mláďaty tohoto druhu dosahují počtu několika set až tisíců jedinců. Lze je nalézt na půdách velkých budov, jsou jimi např. kostely a zámky. Jako zimoviště využívají nejrozličnější podzemní prostory (jeskyně, štoly, sklepy). Jejich hlavní potravou jsou brouci. Tento druh je v ČR označen jako kriticky ohrožený. Latinsky se jmenuje *Myotis myotis*.



1-3 <http://www.volny.cz/daniel.horacek/netopyr/Mnat.htm> [cit.2012-06-07]

bogon-naturfoto.de [cit.2012-06-07]